

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ****NERVIUS<sup>®</sup> 0.18 mg δισκία****NERVIUS<sup>®</sup> 0.7 mg δισκία****NERVIUS<sup>®</sup> 1.1 mg δισκία****Πραμιπεξόλη**

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.**

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

**Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:**

1. Τι είναι το **NERVIUS<sup>®</sup>** και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το **NERVIUS<sup>®</sup>**
3. Πώς να πάρετε το **NERVIUS<sup>®</sup>**
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το **NERVIUS<sup>®</sup>**
6. Λοιπές πληροφορίες

**1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NERVIUS<sup>®</sup> ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ**

Το **NERVIUS<sup>®</sup>** ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστών ως ντοπαμινεργικοί αγωνιστές, οι οποίοι διεγείρουν τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς του εγκεφάλου. Η διέγερση των ντοπαμινεργικών υποδοχέων προκαλεί νευρικές ώσεις στον εγκεφαλο που βοηθούν τον έλεγχο των κινήσεων.

Το **NERVIUS<sup>®</sup>** χρησιμοποιείται για:

- τη θεραπεία των συμπτωμάτων της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με λεβοντόπα.

**2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ NERVIUS<sup>®</sup>**

**Μην πάρετε το NERVIUS<sup>®</sup>**

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη πραμιπεξόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό των δισκίων (βλέπε παράγραφο 6 «Λοιπές πληροφορίες»)

**Προσέξτε ιδιαίτερα με το NERVIUS®**

Αναφέρετε στο γιατρό σας εάν έχετε (είχατε) ή αναπτύξατε οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση ή συμπτώματα, εάν είναι κάποιο από τα παρακάτω:

- νεφρική νόσο.
- ψευδαισθήσεις (βλέπετε, ακούτε ή αισθάνεστε πράγματα που δεν υπάρχουν). Οι περισσότερες ψευδαισθήσεις είναι οπτικές.
- δυσκίνησία (π.χ. μη φυσιολογικές, ή ελεγχόμενες κινήσεις των άκρων).

Εάν έχετε προχωρημένη νόσο του Parkinson και παίρνετε επίσης και λεβοντόπα, μπορεί να αναπτύξετε δυσκίνησία κατά τη διάρκεια αύξησης της δόσης του **NERVIUS®**.

- υπνηλία και αιφνίδια πρόκληση ύπνου.
- αλλαγές στην συμπεριφορά (π.χ. παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, ψυχαναγκαστικές αγορές), αυξημένη γενετήσια ορμή (π.χ. αυξημένη σεξουαλική επιθυμία), κραιπάλη φαγητού.
- ψύχωση (π.χ. συμπτώματα παρόμοια με της σχιζοφρένειας).
- οπτική διαταραχή. Θα πρέπει να κάνετε τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της αγωγής με **NERVIUS®**.
- σοβαρή καρδιακή ή των αγγείων του αίματος νόσο. Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά την πίεση του αίματος, κυρίως κατά την έναρξη της αγωγής. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για την αποφυγή ορθοστατικής υπότασης (πτώση της πίεσης του αίματος ενώ στέκεστε όρθιοι).
- επιδείνωση συμπτωμάτων.

Μπορεί να δείτε ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται νωρίτερα από ότι συνήθως, είναι περισσότερο έντονα και επεκτείνονται περιλαμβάνοντας και άλλα άκρα.

**Παιδιά και έφηβοι**

Το **NERVIUS®** δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ή εφήβους κάτω των 18 ετών.

**Λήψη άλλων φαρμάκων**

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει φάρμακα, φυτικά φάρμακα, τρόφιμα υγιεινής διατροφής ή συμπληρώματα που έχετε λάβει χωρίς συνταγή.

Θα πρέπει να αποφεύγετε να παίρνετε το **NERVIUS®** μαζί με αντιψυχωσικά φάρμακα.

Προσέξτε αν λαμβάνετε τα παρακάτω φάρμακα:

- σιμετιδίνη (για την αγωγή της υπερέκρισης οξέων στο στομάχι ή στομαχικών ελκών)
- αμανταδίνη (που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγωγή της νόσου του Parkinson)
- μεξιλετίνη (για την αγωγή του μη ομαλού καρδιακού ρυθμού, μια κατάσταση γνωστή ως κοιλιακή αρρυθμία)
- ζιδοβουδίνη (η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγωγή του συνδρόμου επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), μια ασθένεια του ανθρώπινου ανοσολογικού συστήματος)
- σισπλατίνη (για την αγωγή διαφορετικών τύπων καρκίνου)
- κινίνη (η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη των νυχτερινών επώδυνων μυϊκών σπασμών και για την αγωγή ενός τύπου ελονοσίας γνωστής ως ημισεληνοειδής ελονοσία (κακοήθης ελονοσία).
- προκαϊναμίδη (για την αγωγή διαταραγμένο καρδιακού ρυθμού).

Εάν λαμβάνετε λεβοντόπα, η δόση της λεβοντόπα συστήνεται να μειώνεται όταν ξεκινήσετε την αγωγή με **NERVIUS**<sup>®</sup>.

Προσέξτε αν παίρνετε ηρεμιστικά φάρμακα (που έχουν κατασταλτική δράση) ή αν πίνετε αλκοόλ. Η προσθετική δράση του **NERVIUS**<sup>®</sup> μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σας για οδήγηση και το χειρισμό μηχανών.

### **Λήψη του **NERVIUS**<sup>®</sup> με τροφές και ποτά**

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί εάν πίνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της αγωγής με **NERVIUS**<sup>®</sup>. Το **NERVIUS**<sup>®</sup> μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό. Καταπίνετε τα δισκία με νερό.

### **Κύηση και θηλασμός**

#### *Κύηση*

Πείτε στο γιατρό σας αν είστε έγκυος, αν σκέφτεστε να μείνετε έγκυος ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος. Ο γιατρός σας θα συζητήσει στη συνέχεια μαζί σας αν θα πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε το **NERVIUS**<sup>®</sup>. Η δράση του **NERVIUS**<sup>®</sup> στο αγέννητο παιδί σας δεν είναι γνωστή. Επομένως, να μην πάρετε το **NERVIUS**<sup>®</sup> εάν είστε έγκυος, εκτός αν σας το υπαγόρευσε ο γιατρός σας.

#### *Θηλασμός*

Το **NERVIUS**<sup>®</sup> δεν θα πρέπει να χορηγείται κατά το θηλασμό. Το **NERVIUS**<sup>®</sup> μπορεί να μειώσει την παραγωγή μητρικού γάλακτος. Επίσης, μπορεί να περάσει στο μητρικό γάλα και να φτάσει το παιδί σας. Εάν η χρήση του **NERVIUS**<sup>®</sup> είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να διακόπτεται ο θηλασμός. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν να λάβετε κάποιο φάρμακο.

### **Οδήγηση και χειρισμός μηχανών**

Το **NERVIUS**<sup>®</sup> μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις (να βλέπετε, ακούτε ή να αισθάνεστε πράγματα που δεν υπάρχουν).

Το **NERVIUS**<sup>®</sup> έχει συσχετισθεί με υπνηλία και επεισόδια αιφνίδιας εμφάνισης ύπνου κυρίως σε ασθενείς με τη νόσο του Parkinson.

Εάν εμφανίσετε αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν θα πρέπει να οδηγήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μηχανές. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν συμβεί αυτό.

### **Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του **NERVIUS**<sup>®</sup>**

Τα δισκία **NERVIUS**<sup>®</sup> περιέχουν μαννιτόλη. Αυτή μπορεί να έχει ήπια υπακτική (κένωση του εντέρου) δράση.

## **3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ **NERVIUS**<sup>®</sup>**

Πάντοτε να παίρνετε το **NERVIUS**<sup>®</sup> αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για την σωστή δοσολογία.

Μπορείτε να λαμβάνετε το **NERVIUS**<sup>®</sup> με ή χωρίς φαγητό. Καταπίνετε τα δισκία με νερό.

**Νόσος του Parkinson**

Η ημερήσια δόση θα πρέπει να λαμβάνεται διαιρεμένη σε 3 ίσες δόσεις.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, η συνήθης δόση είναι ½ δισκίο **NERVIUS**<sup>®</sup> 0.18 mg τρεις φορές την ημέρα (που ισοδυναμεί με 0.27 mg ημερησίως):

|                          | <b>1<sup>η</sup> εβδομάδα</b>                                      |
|--------------------------|--|
| Αριθμός δισκίων          | ½ δισκίο <b>NERVIUS</b> <sup>®</sup> 0.18 mg τρεις φορές ημερησίως |
| Ολική ημερήσια δόση (mg) | 0.27   |

Αυτή θα αυξάνεται κάθε 5-7 ημέρες όπως θα καθορισθεί από το γιατρό σας εως ότου ρυθμιστούν τα συμπτώματά σας (δόση συντήρησης).

|                          | <b>2<sup>η</sup> εβδομάδα</b>                                      | <b>3<sup>η</sup> εβδομάδα</b>  |
|--------------------------|--|--|
| Αριθμός δισκίων          | 1 δισκίο <b>NERVIUS</b> <sup>®</sup> 0.18 mg τρεις φορές ημερησίως | ½ δισκίο <b>NERVIUS</b> <sup>®</sup> 0.7 mg τρεις φορές ημερησίως<br>ή<br>2 δισκία <b>NERVIUS</b> <sup>®</sup> 0.18 mg τρεις φορές ημερησίως |
| Ολική ημερήσια δόση (mg) | 0.54   | 1.1  |

Η συνήθης δόση συντήρησης είναι 1.1 mg ανά ημέρα. Παρ' όλα αυτά, μπορεί η δόση σας να αυξηθεί και περαιτέρω. Εάν είναι απαραίτητο, ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση του δισκίου έως το μέγιστο των 3.2 mg πραμιπεξόλης ανά ημέρα.

|                          | <b>Χαμηλότερη δόση συντήρησης</b>                                  | <b>Υψηλότερη δόση συντήρησης</b>                                    |
|--------------------------|--|---|
| Αριθμός δισκίων          | ½ δισκίο <b>NERVIUS</b> <sup>®</sup> 0.18 mg τρεις φορές ημερησίως | 1 ½ δισκίο <b>NERVIUS</b> <sup>®</sup> 0.7 mg τρεις φορές ημερησίως |
| Ολική ημερήσια δόση (mg) | 0.27   | 3.2   |

**Ασθενείς με νεφρική νόσο**

Εάν έχετε μέτρια ή σοβαρή νεφρική νόσο, ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει χαμηλότερη δόση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνετε τα δισκία μόνο μία ή δύο φορές ημερησίως. Εάν έχετε μέτρια νεφρική νόσο, η συνήθης δόση έναρξης είναι ½ δισκίο **NERVIUS**<sup>®</sup> 0.18 mg δύο φορές ημερησίως. Σε σοβαρή νεφρική νόσο, η συνήθης δόση έναρξης είναι ½ δισκίο **NERVIUS**<sup>®</sup> 0.18 mg την ημέρα.

**Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση **NERVIUS**<sup>®</sup> από την κανονική**

Εάν κατά λάθος πάρετε περισσότερα δισκία

-επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο με τμήμα επειγόντων περιστατικών αμέσως για να σας καθοδηγήσουν.

-μπορεί να εμφανίσετε έμετο, ανησυχία, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στην παράγραφο 4 (Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες)

#### **Εάν ξεχάσετε να πάρετε το NERVIUS®**

Μην ανησυχήσετε. Απλά αφήστε αυτή τη δόση εντελώς και πάρτε την επόμενη δόση σας στη σωστή ώρα. Μην επιχειρήσετε να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

#### **Εάν σταματήσετε να παίρνετε το NERVIUS®**

Μην σταματήσετε να παίρνετε το **NERVIUS®** πριν το συζητήσετε πρώτα με το γιατρό σας. Εάν πρέπει να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο, ο γιατρός σας θα μειώσει τη δόση σταδιακά. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο της επιδείνωσης των συμπτωμάτων.

Αν πάσχετε από νόσο του Parkinson δεν πρέπει να σταματήσετε την αγωγή σας με **NERVIUS®** απότομα. Η ξαφνική διακοπή μπορεί να σας προκαλέσει μία ιατρική κατάσταση που λέγεται κακοήθης νευροληπτικό σύνδρομο που μπορεί να αποτελεί μείζονα κίνδυνο για την υγεία σας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

- ακίνησια (απώλεια κίνησης των μυών)
- άκαμπτους μύες
- πυρετό
- ασταθή πίεση του αίματος
- ταχυκαρδία (αυξημένο καρδιακό ρυθμό)
- σύγχυση
- καταστολή του επιπέδου της συνειδήσεως (κώμα)

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

#### **4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και το **NERVIUS®** μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Η εκτίμηση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται στις εξής συχνότητες:

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Πολύ συχνές:</b>  | Επηρεάζει περισσότερους από 1 χρήστη στους 10                 |
| <b>Συχνές:</b>       | Επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100                          |
| <b>Όχι συχνές:</b>   | Επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000                        |
| <b>Σπάνιες:</b>      | Επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000                       |
| <b>Πολύ σπάνιες:</b> | Επηρεάζει λιγότερους από 1 χρήστη στους 10.000                |
| <b>Άγνωστο</b>       | Η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα |

Εάν πάσχετε από νόσο του Parkinson, μπορεί να εμφανίσετε τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες (ανεξαρτήτως της ενδείξεως):

#### Πολύ συχνές:

- Δυσκίνησια (π.χ. μη φυσιολογικές, ή ελεγχόμενες κινήσεις των άκρων)

- Υπνηλία
- Ζαλάδα
- Ναυτία (τάση προς έμετο)
- Υπόταση (χαμηλή πίεση του αίματος)

Συχνές:

- Τάση για ασυνήθιστη συμπεριφορά
- Ψευδαισθήσεις (όταν βλέπετε, ακούτε ή νιώθετε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν)
- Σύγχυση
- Αίσθημα κόπωσης (κόπωση)
- Έλλειψη ύπνου (αϋπνία)
- Περίσσια υγρών, συνήθως στα πόδια (περιφερικό οίδημα)
- Πονοκέφαλος
- Μη φυσιολογικά όνειρα
- Δυσκοιλιότητα
- Ανησυχία
- Αμνησία (διαταραχή της μνήμης)
- Οπτική διαταραχή
- Έμετος (ναυτία)
- Απώλεια βάρους

Όχι συχνές:

- Παράνοια (π.χ. υπερβολικοί και αδικαιολόγητοι φόβοι)
- Παραίσθηση
- Εκτεταμένη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και αιφνίδια επεισόδια ύπνου
- Υπερκινησία (αυξημένες κινήσεις και ανικανότητα επίτευξης ακινησίας)
- Αύξηση του σωματικού βάρους
- Αυξημένη σεξουαλική επιθυμία (π.χ. αύξηση της γενετήσιας ορμής)
- Αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. εξάνθημα, κνησμός, υπερευαισθησία)
- Λιποθυμία
- Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται υψηλές δόσεις του **NERVIUS®**
- Υπερσεξουαλικότητα
- Ψυχαναγκαστικές αγορές
- Δύσπνοια (δυσκολίες στην αναπνοή)
- Πνευμονία (λοίμωξη των πνευμόνων)

Άγνωστη συχνότητα:

- Αύξηση του φαγητού (κραιπάλη φαγητού, υπερφαγία)

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.



## 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NERVIUS®

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείται το NERVIUS® μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

## 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Τι περιέχει το NERVIUS®

Η δραστική ουσία είναι η πραμιπεξόλη.

0.18 mg δισκία: κάθε δισκίο περιέχει 0.18 mg pramipexole βάσεως (ως 0.25 mg pramipexole άλατος [διϋδροχλωρική μονοϋδρική]).

0.7 mg δισκία: κάθε δισκίο περιέχει 0.7 mg pramipexole βάσεως (ως 1.0 mg pramipexole άλατος [διϋδροχλωρική μονοϋδρική]).

1.1 mg δισκία: κάθε δισκίο περιέχει 1.1 mg pramipexole βάσεως (ως 1.5 mg pramipexole άλατος [διϋδροχλωρική μονοϋδρική]).

Τα άλλα συστατικά είναι: μαννιτόλη, άμυλο αραβοσίτου, άνδρο κολλοειδές πυρίτιο, ποβιδόνη K25 και στεατικό μαγνήσιο

### Εμφάνιση του NERVIUS® και περιεχόμενο της συσκευασίας

0.18 mg δισκία: λευκά, αμφίκυρτα, επιμήκη, χαραγμένα και στις δύο πλευρές δισκία (διαστάσεις: 8mm×4mm περίπου).

0.7 mg δισκία: λευκά, στρογγυλά, επίπεδα, χαραγμένα στη μια πλευρά δισκία (διαμέτρου: 9mm περίπου).

1.1 mg δισκία: λευκά, στρογγυλά, επίπεδα, χαραγμένα και στις δυο πλευρές (διαμέτρου: 11 mm περίπου).

Το NERVIUS® είναι διαθέσιμο σε συσκευασία blister των 30, 100 δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

**Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας**

TARGET PHARMA

Μενάνδρου 54

10431, Αθήνα

Τηλ.: 210 52 24 830 Φαξ: 210 52 24 838

E-mail: [info@targetpharma.gr](mailto:info@targetpharma.gr), [www.targetpharma.gr](http://www.targetpharma.gr)

**Παραγωγός**

Specifar ABEE,

28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1,

1235 51 Αγία Βαρβάρα,

Αθήνα

Τηλ: 210 54 01 500

E-mail: [info@specifar.gr](mailto:info@specifar.gr)

**Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 11/2016**

